



Brian Waterman, MD

SPORTS MEDICINE & ORTHOPEDICS

POSTOPERATORIO DE REPARACIÓN ARTROSCÓPICA DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES INSTRUCCIONES

1. DIETA

- Comience con líquidos claros y comidas ligeras (gelatina, sopas, etc.) • Progrese a su dieta normal si no tiene náuseas.

1. CUIDADO DE HERIDAS

- Mantenga su vendaje quirúrgico, afloje el vendaje si se hincha el codo, la muñeca o la mano.
 - Es normal que el hombro sangre e hinche después de la cirugía; si la sangre empapa el vendaje, no se alarme; refuércelo con vendajes adicionales.

- Retire el vendaje quirúrgico en el segundo día postoperatorio. • Para evitar infecciones, mantenga las incisiones quirúrgicas limpias y secas; cúbralas incisiones con curitas impermeables O puede ducharse colocando una bolsa de basura grande sobre su cabestrillo a partir del día después de la cirugía. • Una vez que se hayan retirado los vendajes quirúrgicos, puede ducharse con curitas impermeables en su lugar. No frote el área y seque con palmaditas; NO sumerja el brazo operado (es decir, baño).

3. MEDICAMENTOS

- Se inyecta medicamento para el dolor en la herida y la articulación del tobillo durante la cirugía; el efecto desaparecerá en 8 a 12 horas. • La mayoría de los pacientes requerirán analgésicos narcóticos durante un período corto de tiempo; se pueden tomar según las instrucciones del frasco o Medicamento principal = Norco (hidrocodona) o Tomar 1 a 2 tabletas cada 4 a 6 horas según sea necesario o Máx. de 12 pastillas por día o Planee usarlo de 2 a 5 días, dependiendo del nivel de dolor o NO tome Tylenol (acetaminofén) adicional mientras toma

Norco

- Los efectos secundarios comunes de los analgésicos son náuseas, somnolencia y estreñimiento. Para disminuir los efectos secundarios, tome el medicamento con alimentos. Si se produce estreñimiento, considere tomar un laxante de venta libre. • Si tiene problemas de náuseas y vómitos, comuníquese con la oficina para posiblemente cambie su medicación. • No conduzca un automóvil ni opere maquinaria mientras toma el narcótico medicamento.
- Ibuprofeno 200-400 mg (es decir, Advil) se puede tomar entre el narcótico analgésicos para ayudar a suavizar los "picos y valles" posoperatorios, reducir la cantidad total de analgésicos necesarios y aumentar los intervalos de tiempo entre el uso de analgésicos narcóticos.

4. ACTIVIDAD



Brian Waterman, MD

SPORTS MEDICINE & ORTHOPEDICS

- Cuando duerma o descansa, las posiciones inclinadas (es decir, una silla reclinable) y una almohada debajo del antebrazo como apoyo pueden proporcionar una mayor comodidad. • No participe en actividades que aumenten el dolor/inflamación (levantar objetos o cualquier actividades repetitivas por encima del nivel del hombro) durante los primeros 7 a 10 días después de la cirugía.
- Evite largos períodos de estar sentado (sin apoyo del brazo) o viajar largas distancias durante 2 semanas. • NO conducir hasta que el médico le indique lo contrario. • Puede regresar SOLAMENTE al trabajo sedentario o a la escuela 3-4 días después de la cirugía, si el dolor es tolerable.

5. INMOVILIZADOR •

Su inmovilizador debe usarse en todo momento excepto por higiene y ejercicio.

6. TERAPIA DE HIELO

- La formación de hielo es muy importante en el período postoperatorio inicial y debe comenzar inmediatamente después de la cirugía.
- Use la máquina de hielo de forma continua o compresas de hielo (si no se receta la máquina) cada 2 horas durante 20 minutos todos los días hasta su primera visita posoperatoria; recuerde mantener la extremidad elevada al nivel del pecho mientras aplica hielo. • Las máquinas de hielo no están cubiertas por el seguro, pero se pueden comprar en Dr. Waterman's clinic o a través de un minorista en línea de su elección.

7. EJERCICIO • No

se debe hacer ningún ejercicio o movimiento del hombro hasta que su médico o fisioterapeuta se lo indique.

- Puede comenzar el rango de movimiento del codo, la muñeca y la mano en el primer poste día operativo alrededor de 2-3 veces por día.
- La fisioterapia formal (PT) comenzará entre 7 y 10 días después de la operación. Por favor llame a la ubicación de PT de su elección para programar citas.

8. EMERGENCIAS

- Comuníquese con el Dr. Waterman o su enfermera al 336-716-8091 si se presenta alguno de los siguientes están presentes:

- o Hinchazón dolorosa o entumecimiento o
- Dolor incesante o Fiebre (más de 101° - es normal tener un grado bajo de fiebre por primera uno o dos días después de la cirugía) o escalofríos
- o Enrojecimiento alrededor de las incisiones o Cambio de color en la muñeca o la mano o Drenaje continuo o sangrado de la incisión (una pequeña cantidad de se espera drenaje)
- o Dificultad para respirar o
- Náuseas/vómitos excesivos



Brian Waterman, MD

SPORTS MEDICINE & ORTHOPEDICS

- **Si tiene una emergencia después del horario de oficina o durante el fin de semana, comuníquese con el mismo número de oficina (336-716-8091) y se lo conectará a nuestro servicio de página; se comunicarán con el Dr. Waterman o uno de sus colegas si él no está disponible. NO llame al hospital o centro quirúrgico.
- **Si tiene una emergencia que requiere atención inmediata, diríjase a la sala de emergencias más cercana.

9. Atención de seguimiento + Preguntas

- Un miembro del equipo del Dr. Waterman lo llamará dentro de las 48 horas posteriores a la cirugía para abordar cualquier pregunta o inquietud. Si no lo han contactado dentro de las 48 horas posteriores a la cirugía, llame a la oficina al 336-716-8091.
- Por lo general, la primera cita posoperatoria después de la cirugía es de 10 a 14 días siguientes a la cirugía.
- Si aún no tiene una cita posoperatoria programada, comuníquese con la oficina durante el horario normal de oficina (336-716-8091) y solicite la programación de una cita.
- La primera cita postoperatoria será con uno de los Médicos Asistentes. Evaluarán la herida, revisarán el protocolo posoperatorio y responderán cualquier pregunta que pueda tener sobre el procedimiento.